

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO PARA HERBICIDAS HORMONAIS

O conteúdo deste material tem como objetivo atender as Instruções Normativas **SEAPDR No. 05, 06, 08 e 09/2019 e 05/2020**, fornecendo informações técnicas sobre o uso correto dos herbicidas à base de Dicamba (ATECTRA®) e Quincloraque (FACET®), assim como, informar os requisitos mínimos que regulamentam a venda orientada no estado do Rio Grande do Sul.

Para o uso correto de herbicidas é importante conhecer o histórico das plantas daninhas, o posicionamento correto dos produtos de acordo com as recomendações de bula, estar treinado e seguro sobre noções básicas de:

- **Uso correto e seguro de agrotóxicos: responsabilidades do produtor, aplicador, armazenagem;**
- **Uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) e cuidados com a segurança do aplicador e do ambiente;**
- **Tecnologia de aplicação de agrotóxicos, incluindo preparo de calda, técnicas de redução de deriva, pontas de pulverização e limpeza de tanque;**
- **Manutenção, regulagem e calibração de pulverizadores agrícolas.**

VENDA ORIENTADA DOS HERBICIDAS HORMONAIS NO RIO GRANDE DO SUL

Venda orientada é o conjunto de medidas envolvendo a prescrição de herbicidas hormonais, o comércio e o uso destes produtos.

Portanto, o estabelecimento comercial somente poderá comercializar herbicidas hormonais no Rio Grande do Sul, mediante a apresentação da Declaração do Cadastro Estadual de Aplicador de Agrotóxicos (IN SEAPDR N°06/2019), da Declaração do Produtor Rural (IN SEAPDR N° 09/2019), além de prover o alerta aos produtores rurais, adquirentes dos herbicidas hormonais, quando da existência de cultivos sensíveis a estes produtos, próximos aos locais de aplicação (IN SEAPDR N° 08/2019).

Para maiores informações, consultar as Instruções Normativas SEAPDR N° 05/2019, N° 06/2019, N° 08/2019, N° 09/2019 e N° 05/2020.

☎ 0800 0192 500
f BASF.AgroBrasil
i BASF Agricultural Solutions
▶ BASF.AgroBrasilOficial
g agriculture.basf.com/br/pt.html
b blogagro.basf.com.br

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

BASF
We create chemistry

ATENÇÃO ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. USO AGRÍCOLA. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO. CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO. INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS. DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA. UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. REGISTRO MAPA: ATECTRA® N° 4916 E FACET® N° 0389004.

Abaixo, seguem recomendações importantes para o uso dos herbicidas ATECTRA® e FACET®:



Treinamento de aplicadores: todos os recomendantes e operadores de Pulverização deverão estar treinados sobre as condições de aplicação de **Atectra®** e **Facet®**.



Aplique somente nas culturas e nos estádios de plantas daninhas recomendados na bula dos produtos.



Aplique **Atectra®** e **Facet®** **SOMENTE** com condições climáticas favoráveis: T < 30° C e UR do ar > 55% e com velocidade do vento entre 3 e 10 km/h. Não aplique quando houver suspeita de inversão térmica.



SEMPRE verifique a presença de cultivos na vizinhança. Deixe uma bordadura de no **MÍNIMO 50 m** entre a aplicação de **Atectra®** e **Facet®** e cultivos susceptíveis.



Ajuste a velocidade de aplicação para no **MÁXIMO 25 km/h**.



Consulte sempre o manual dos fabricantes dos equipamentos e pontas de pulverização para informações sobre tamanho de gotas e pressão de trabalho.



Sempre realize a tríplex lavagem dos tanques, barras de pulverização, incorporadores de agrotóxicos e lave a parte externa dos equipamentos (pulverizador tratorizado ou aeronave agrícola) após o uso dos herbicidas.

Recomendações específicas na aplicação de ATECTRA®:



Aplique **Atectra®** **SOMENTE** em pulverização terrestre e nos estádios de plantas daninhas recomendados. Aplique **Atectra®** **ATÉ 30 DIAS** antes do plantio da soja e inicie o plantio apenas após a ocorrência de pelo menos 50 mm de chuva.



Utilize **SOMENTE** pontas que proporcionam **GOTAS EXTREMAMENTE GROSSAS à ULTRA GROSSAS** com pressão adequada. As pontas homologadas pela BASF até o momento são: TTI (TeeJet), ULDMax (HYPRO), JMD (Jacto) ou MUG (Magnojet).



Calibre o volume de aplicação para no **MÍNIMO 100 L de calda/ha**, visando melhor distribuição das gotas no alvo.



Ajuste a altura da barra para no **MÁXIMO 50 cm** em relação ao alvo.



NUNCA UTILIZE produtos **À BASE** de **AMÔNIO**. Utilize **SOMENTE** glifosato sal potássico.

Veja mais informações sobre o herbicida **Atectra®** por meio do QR CODE.



Recomendações específicas na aplicação de FACET®:



Durante a aplicação aérea de **Facet®**, não utilize atomizadores rotativos, pois produzem gotas mais finas e suscetíveis a deriva.



Utilize as recomendações de adjuvantes contida na bula do **Facet®**, visando melhor cobertura dos alvos biológicos. Siga orientação de um engenheiro agrônomo quanto a aplicação sequencial de outros produtos.



O herbicida **Facet®** já é comercializado há muitos anos no controle em pós-emergência das plantas daninhas para a cultura de arroz irrigado. Esse resultado é possível em função da correta utilização do produto de acordo com as recomendações de bula.



Durante a aplicação aérea de **Facet®**, calibre a aeronave para o volume de aplicação entre 30 e 50 L/ha.

Veja mais informações sobre o herbicida **Facet®** por meio do QR CODE.



ATENÇÃO: SEMPRE VERIFIQUE A PRESENÇA DOS CULTIVOS VIZINHOS E DEIXE UMA BORDADURA DE NO MÍNIMO 50 M ENTRE A APLICAÇÃO DOS HERBICIDAS E OS CULTIVOS SENSÍVEIS, COMO FRUTÍFERAS (UVA, OLIVA, MAÇÃ, NOZ-PECAN, PÊSSEGO ENTRE OUTRAS), CULTIVOS HORTÍCOLAS (TOMATE, BATATA, FOLHOSAS EM GERAL), FUMO, ERVA-MATE E CULTIVOS NÃO TOLERANTES (GENETICAMENTE MODIFICADOS) A ESTES HERBICIDAS.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

BASF
We create chemistry