
GUIA DE VARIEDADES

2027/2028

SoyTech®

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 **BASF**
We create chemistry



A SUA PRÓXIMA GERAÇÃO DE **RESULTADOS** ESTÁ AQUI.



Na **SoyTech®**, cada semente é resultado de ciência, tecnologia e compromisso com quem produz. Somos a marca de licenciamento de sementes de soja da BASF, criada para entregar genética de alta performance, potencializando a produtividade no campo e transformando cada cultivar em resultado real. Porque acreditamos que, ao lado de quem multiplica, distribui e planta, nasce **sua próxima geração de resultados**.



ÍNDICE

CENTRO-NORTE

5

Lançamento

6

ST 767 TF I2X

6

ST 798 I2X

7

ST 808 I2X

8

Intacta 2 Xtend

9

ST 616 I2X

9

ST 711 I2X

10

ST 745 I2X

11

ST 752 I2X

12

ST 822 I2X

13

ST 828 I2X

14

SUL

15

Lançamento

16

ST 567 I2X

16

ST 627 I2X

17

Intacta 2 Xtend

18

ST 541 I2X

18

ST 570 I2X

19

ST 616 I2X

20

ST 655 I2X

21

ST 670 I2X

22

Prática de Refúgio

23

Mapa de Recomendação

25



REGIÃO

CENTRO-NORTE

ST 767 TF I2X

BSA76356I2X

LANÇAMENTO

SoyTech®

7.6 Grupo de maturação

200g Peso de mil grãos

TOLERANTE À FERRUGEM ASIÁTICA

ELEVADO PESO DE GRÃOS

MÚLTIPLA RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE DE CISTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto imperfeito

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET			OUT			NOV		
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
301	Chapadões	18				240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	260-280
301/ 401	Sudoeste GO	19			260-300	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300
302/ 303	Pontal MG/ Sul GO	20			260-300	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300
303	Triângulo MG/ Sudeste GO	22					220-260	220-260	220-260	220-260	240-260
304	GO / MG	24					220-260	220-260	220-260	220-260	240-280
304	GO / MG (Irrigado)	24			220-260	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	220-260
401	MT Sul	25		280-300	260-280	260-280	240-260	240-260			
401	Grande Primavera	26		280-300	260-280	260-280	240-260	240-260			
402	Parecis	27		300-320	280-300	280-300	280-300	280-300			
402	BR 163	28		300-320	280-300	280-300	280-300	280-300			
402	Rondônia	29				260-280	260-280	240-260	240-260		
404	Norte GO	31					240-260	240-260	240-260	240-260	240-280

*Levar em consideração todas as janelas de vazios sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

REAÇÃO A DOENÇAS

R MR

Nematoide de Cisto Raças: 3 e 14

● ○

Nematoide de Cisto Raça: 1

○ ●

Ferrugem asiática

○ ●

Pústula Bacteriana

● ○

Cancro da Haste

● ○



INTACTA2XTEND

BASF We create chemistry

ST 798 I2X

BSA79090I2X

LANÇAMENTO

SoyTech®

7.9 Grupo de maturação

203g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

ELEVADO PESO DE GRÃOS

SANIDADE FOLIAR

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Marrom claro

FLOR: Branca

HILO: Marrom

REAÇÃO A DOENÇAS

R MR

Cancro da Haste D. aspalathi

● ○

Podridão R. de Fitóftora

● ○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET			OUT			NOV	
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
401	MT Sul	25		220-240	220-240	200-220	180-200	180-200	180-200	
401	Grande Primavera	26		220-240	220-240	200-220	180-200	180-200	180-200	
402	BR 163	28		220-240	220-240	200-220	200-220	200-220		
402	Parecis	27		220-240	220-240	200-220	200-220	200-220		
402	Rondônia	29				180-200	180-200	160-180	160-180	160-180
403	Vale do Araguaia	30			240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240
405	Bahia	34			240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260
501	MA / PI	35				260-300	260-300	260-280	260-280	260-280

*Levar em consideração todas as janelas de vazios sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



ST 808 I2X

BSA80624I2X

LANÇAMENTO

SoyTech®

8.0 Grupo de maturação

195g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

QUALIDADE E ELEVADO PESO DE GRÃOS

RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE DE CISTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Marrom média

FLOR: Branca

HILO: Preto

REAÇÃO A DOENÇAS

	R	MR
Nematoide de Cisto Raça: 3	●	○
Nematoide de Cisto Raças: 6 e 14	○	●
Podridão R. de Fitóftora	●	○
Pústula Bacteriana	●	○
Cancro da Haste	●	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET		OUT			NOV		
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
401	MT Sul	25	220-240	220-240	200-220	180-200	180-200	180-200		
401	Grande Primavera	26	220-240	220-240	200-220	180-200	180-200	180-200		
402	BR 163	28	220-240	220-240	200-220	200-220	200-220			
402	Parecis	27	220-240	220-240	200-220	200-220	200-220			
402	Rondônia	29			180-200	180-200	160-180	160-180	160-180	
403	Vale do Araguaia	30		240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	
404	TO Sul	32			260-280	260-280	240-260	240-260	240-260	240-260
501	Norte TO / Sul PA	33			260-280	260-280	240-260	240-260	240-260	240-260
405	Bahia	34			200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	240-260
501	MA / PI	35			280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280

*Levar em consideração todas as janelas de vazios sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



ST 616 I2X

6.1 Grupo de maturação

185g Peso de mil grãos

ESTABILIDADE PRODUTIVA

TOLERÂNCIA AO CALOR

RESISTÊNCIA À FITÓFTORA E DESEMPENHO EM ÁREAS COM MACROPHOMINA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

Podridão R. de Fitóftora R (Rps1k)

Cancro da Haste

R MR

● ○

● ○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET			OUT			NOV			DEZ		
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
101	Coxilha	01					220-240	220-240	220-240	220-260	240-260	280-320	300-340	
101	Várzea	01							220-240	220-260	260-300	280-300	300-360	300-360
102	RS / SC (<400m)	02					240-260	230-250	230-250	230-250	230-250	250-270		
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04				220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	230-250			
102	RS / SC Transição (entre 400 e 650m)	03					220-240	220-240	220-240	220-250	220-250	230-250		
102	Sudoeste PR	05			240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260				
103	Campos Gerais (>750m)	06				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
103	Campos Gerais (<750m)	07				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-300	220-340		
103	Sudoeste SP	08		240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
104	Litoral SC	09				200-220	200-220	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260	260-280	
201	Beira Lago	10	260-280	240-260	220-260	200-260	200-260	200-260	240-260					
201	Transição PR	11	240-260	240-260	220-260	220-260	220-260	220-260	200-260					
201/ 203	Norte PR / Sul SP	12			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-320				
202	Arenito	13			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Grande Dourados	14			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Fronteira	15			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-340				
204	Serra	16			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
302	SP Baixa Altitude	21					220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-320		
303	Sul de Minas	23				220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	240-300		
405	Bahia	34				380-420	380-420							

*Levar em consideração todas as janelas de vazios sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



INTACTA2XTEND

BASF We create chemistry

ST 711 I2X

SoyTech®

7.1 Grupo de maturação

176g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

PRECOCIDADE

MÚLTIPLA RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE DE CISTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

	R	MR
Nematoide de Cisto Raça: 3	●	○
Nematoide de Cisto Raças: 9, 10 e 14	○	●
Podridão R. de Fitóftora	○	●
Cancro da Haste	●	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET		OUT			NOV		
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
301	Chapadões	18			280-320	280-300	280-300	280-300	280-300	
301	MS Norte	17			280-320	280-300	280-300	280-300	280-300	280-340
301 / 401	Sudoeste GO	19			300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-380
302	SP Baixa Altitude	21				240-280	240-280	240-280	240-340	260-360
302 / 303	Pontal MG / Sul GO	20		300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	280-380	300-380
303	Sul de Minas	23			220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	
303	Triângulo MG/ Sudeste GO	22			280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	
304	GO / MG	24				260-300	260-300	260-300	260-300	
404	Norte GO	31				280-320	280-320	280-320	280-320	300-380
401	Grande Primavera	26	340-360	320-360	320-340	300-320	300-320	300-320	300-320	
401	MT Sul	25	340-360	320-340	300-320	300-320	300-320	300-320	300-400	
402	BR 163	28	360-380	340-360	340-360	320-340	320-340	320-340	340-360	
402	Parecis	27	360-380	340-360	320-360	320-340	320-340	320-340	320-420	
402	Rondônia	29			280-300	280-300	280-300	280-300	280-380	
403	Vale do Araguaia	30			380-400	360-400	360-380	360-380	360-380	360-380
405	Bahia	34			380-400	380-400	380-400	380-400		

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

■ Recomendado ■ Tolerado

INTACTA2
XTENDBASF
We create chemistry

ST 745 I2X

BSA74483I2X

SoyTech®

7.4 Grupo de maturação

170g Peso de mil grãos

 TOLERANTE AO ACAMAMENTO

 NÃO É STS

 MÚLTIPLA RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE DE CISTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Marrom claro

REAÇÃO A DOENÇAS

	R	MR
Nematoide de Cisto Raça: 3	☒	☐
Nematoide de Cisto Raças: 6, 10 e 14	☐	☒
Cancro da Haste	☒	☐
Pústula Bacteriana	☒	☐

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET		OUT			NOV			DEZ
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
301	Chapadões	18			280-300	280-300	280-300	280-300			
301/ 401	Sudoeste GO	19		300-320	300-320	280-320	280-320	280-320			
302/ 303	Pontal Sul GO	20		300-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-300	300-360
303	Triângulo MG/ Sudeste GO	22			260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-300	320-380
304	GO / MG	24				300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	320-380
304	GO / MG (Irrigado)	24		260-300	260-300	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300	360-420
401	MT Sul	25		320-340	320-340	300-320	300-320				
401	Grande Primavera	26		320-340	320-340	300-320	300-320				
402	Parecis	27	340-360	320-340	320-340	320-340	320-340	320-340			
402	BR 163	28	340-360	320-340	320-340	320-340	320-340	320-340			
402	Rondônia	29			300-320	280-300	280-300	280-300	300-360		
403	Vale do Araguaia	30		340-360	340-360	340-360	320-340	300-340			
404	Norte GO	31				300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	

*Levar em consideração todas as janelas de vazios sanitário da sua região.

 Recomendado  Tolerado



INTACTA2[®]
XTEND

 **BASF**
We create chemistry

ST 752 I2X

SoyTech®

7.5 Grupo de maturação

204g Peso de mil grãos

ESTABILIDADE PRODUTIVA

ELEVADO PESO DE GRÃOS

MÚLTIPLA RESISTÊNCIA AO NEMATOIDE DE CISTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

	R	MR
Nematoide de Cisto Raças: 3 e 14	●	○
Nematoide de Cisto Raças: 6 e 9	○	●
Podridão R. de Fitóftora	●	○
Cancro da Haste D. aspalathi	●	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET		OUT			NOV			DEZ			JAN	
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
301 / 401	Sudoeste GO	19		240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-370		
301	Chapadões	18			220-240	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220		
301	MS Norte	17		220-240	220-240	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-370		
302 / 303	Pontal MG / Sul GO	20			240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240					
303	Triângulo MG/ Sudeste GO	22			200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220					
302	SP Baixa Altitude	21				180-200	180-200	180-200	180-200	180-200	220-370				
304	GO / MG	24				200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-370				
304	GO / MG (Irrigado)	24		200-240	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	200-220				
404	Norte GO	31				220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	220-380				
401	Grande Primavera	26	300-320	300-320	260-280	240-280	240-280	240-280	240-280	280-380					
401	MT Sul	25	300-320	300-320	260-280	240-280	240-280	240-280	240-280	280-380					
402	BR 163	28	300-320	300-320	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-380					
402	Parecis	27	300-320	300-320	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-380					
402	Rondônia	29			240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-300	280-420				
403	Vale do Araguaia	30			340-360	300-320	300-320	300-320	300-320	300-320	300-380				
405	Bahia	34			280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	300-420				
501	MA / PI	35			300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	300-400				
404	TO Sul	32				300-360	300-360	300-360	300-360	300-360					
501	Norte TO / Sul PA	33				340-400	340-400	340-400	340-400	340-400					
502	Norte PA / MA	36									300-340	300-340	300-340	300-340	300-340

*Levar em consideração todas as janelas de vazios sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



INTACTA2XTEND

BASF
We create chemistry

ST 822 I2X

8.2 Grupo de maturação

195g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

ELEVADO PESO DE GRÃOS

TOLERÂNCIA À CHUVA NA COLHEITA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

Cancro da Haste D. aspalathi

Pústula Bacteriana

R MR

● ○

● ○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET		OUT			NOV			DEZ			JAN	
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
301	MS Norte	17			180-200	180-200	180-200	180-200	180-200	180-280					
301/ 401	Sudoeste GO	19			180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	180-280					
304	GO / MG	24			200-240	180-220	180-220	180-220	180-220	180-280					
401	MT Sul	25	220-240	220-240	200-220	200-220	200-220	200-300							
401	Grande Primavera	26	220-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-300							
402	BR 163	28	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-320							
402	Parecis	27	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-320							
402	Rondônia	29			200-220	180-200	180-200	180-200	180-330						
403	Vale do Araguaia	30			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260					
404	Norte GO	31			220-260	200-240	200-240	200-240	200-240	200-280					
404	TO Sul	32			240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-340					
405	Bahia	34			200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-320					
501	Norte TO / Sul PA	33			240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-340					
501	MA / PI	35				240-260	240-260	240-260	240-260	240-340					
502	Norte PA / MA	36				240-260	240-260	240-260	240-260	240-340	240-260	240-260	240-260	240-260	240-340

*Levar em consideração todas as janelas de vazios sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



INTACTA2
XTEND

BASF
We create chemistry

ST 828 I2X

BSA82524I2X

SoyTech®

8.2 Grupo de maturação

180g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO

TOLERANTE AO ACAMAMENTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Branca

HILO: Marrom claro

REAÇÃO A DOENÇAS

	R	MR
Podridão R. de Fitóftora	☐	☒
Cancro da Haste	☒	☐
Pústula Bacteriana	☒	☐

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET	OUT			NOV			DEZ
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
304	GO / MG	24			200-220	180-220	180-220	180-220	200-240	
402	Parecis	27	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220	240-260		
402	BR 163	28	200-220	200-220	180-200	180-200	180-200	240-260		
403	Vale do Araguaia	30			240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	260-320
404	Norte GO	31				220-260	220-240	220-240	220-240	220-260
404	TO Sul	32				240-260	230-250	230-250	230-250	240-320
405	Bahia	34				230-250	210-220	210-220	210-220	230-270
501	Norte TO / Sul PA	33				240-260	230-250	230-250	230-250	240-320
501	MA / PI	35				240-260	230-250	230-250	230-250	240-320

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado





REGIÃO

SUL

ST 567 I2X

BSA56822I2X

LANÇAMENTO

SoyTech®

5.7 Grupo de maturação

199g Peso de mil grãos

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET	OUT			NOV		
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04			260-280	260-280	260-280	260-280	260-280
103	Sudoeste de SP	08	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	
103	Campos Gerais (<750m)	07	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	
102	Sudoeste PR	05	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

TOLERANTE AO ACAMAMENTO

RESISTÊNCIA À FITÓFTORA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Marrom

FLOR: Roxa

HILO: Preto

REAÇÃO A DOENÇAS

R MR

Podridão R. de Fitóftora R (Rps1c)	●	○
Pústula Bacteriana	●	○
Cancro da Haste	●	○



INTACTA2XTEND

BASF We create chemistry

ST 627 I2X

LANÇAMENTO

BSA62130I2X

SoyTech®

6.2 Grupo de maturação

196g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

ELEVADO PESO DE GRÃOS

MÚLTIPLA RESISTÊNCIA À FITÓFTORA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Podridão R. de Fitóftora R (Rps1k)	●	○
Pústula Bacteriana	●	○
Cancro da Haste	●	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET		OUT			NOV			DEZ	
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
201	Transição PR	11		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
201	Beira Lago	10	260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12		260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
202	Arenito	13		260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
204	Serra	16		260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
204	Fronteira	15		260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
204	Grande Dourados	14		260-280	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-280	
101	Coxilha	01		260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320	260-320

*Levar em consideração todas as janelas de vazão sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



ST 541 I2X

5.4 Grupo de maturação

205g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

ELEVADO PESO DE GRÃOS

PRECOCIDADE

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto perfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

R MR

Podridão R. de Fitóftora R (Rps1k)

● ○

Cancro da Haste D. aspalathi

● ○

Pústula Bacteriana

● ○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET	OUT			NOV			DEZ
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
101	Coxilha	01		330-350	320-340	300-320	300-320	300-320	320-350	330-350
102	RS / SC Transição (entre 400 e 650m)	03		330-350	320-350	320-350	320-350	320-350	330-370	
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04	270-290	280-300	280-300	280-300	280-300	280-300	320-340	
103	Campos Gerais (>750m)	06		280-300	280-300	280-300	280-300	280-300	280-370	
103	Campos Gerais (<750m)	07	280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-370	
103	Sudoeste SP	08	340-360	300-320	300-320	300-320	300-320	320-360	320-360	
104	Litoral SC	09			320-340	280-300	280-300	280-300	300-320	320-340
201	Transição PR	11		300-320	280-300	280-300	300-320	320-350	320-340	

*Levar em consideração todas as janelas de vazão sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



ST 570 I2X

BSA57079I2X

SoyTech®

5.7 Grupo de maturação

189g Peso de mil grãos

 **ALTO POTENCIAL PRODUTIVO**

 **SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO**

 **POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO**

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

R MR

Podridão R. de Fitóftora R (Rps1c)

● ○

Cancro da Haste

● ○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET		OUT			NOV			DEZ
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
101	Coxilha	01					220-240	220-240	230-250	240-260	260-350
101	Várzea	01						240-260	260-280	280-320	280-350
102	RS / SC (<400m)	02				250-270	240-260	240-260	240-260	250-260	
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04			200-220	200-240	200-240	220-240	220-240	240-260	
102	RS / SC Transição (entre 400 e 650m)	03				220-240	220-240	220-240	240-260	240-260	
102	Sudoeste PR	05	260-280	260-280	230-260	230-260	230-260	230-260	230-260	240-280	
103	Campos Gerais (>750m)	06			230-250	220-240	220-240	220-240	220-240	230-330	
103	Campos Gerais (<750m)	07			220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300	
103	Sudoeste de SP	08		240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	230-350	
104	Litoral SC	09					200-220	220-240	220-240	240-260	260-350
201	Transição do PR	11	260-300	260-280	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	260-280	

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



ST 616 I2X

SoyTech®

6.1 Grupo de maturação

185g Peso de mil grãos

ESTABILIDADE PRODUTIVA

TOLERÂNCIA AO CALOR

RESISTÊNCIA À FITÓFTORA E DESEMPENHO EM ÁREAS COM MACROPHOMINA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

Podridão R. de Fitóftora R (Rps1k)

Cancro da Haste

R MR

● ○

● ○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET			OUT			NOV			DEZ		
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
101	Coxilha	01					220-240	220-240	220-240	220-260	240-260	280-320	300-340	
101	Várzea	01							220-240	220-260	260-300	280-300	300-360	300-360
102	RS / SC (<400m)	02					240-260	230-250	230-250	230-250	230-250	250-270		
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04				220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	230-250			
102	RS / SC Transição (entre 400 e 650m)	03					220-240	220-240	220-240	220-250	220-250	230-250		
102	Sudoeste PR	05			240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260				
103	Campos Gerais (>750m)	06				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
103	Campos Gerais (<750m)	07				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-300	220-340		
103	Sudoeste SP	08		240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
104	Litoral SC	09				200-220	200-220	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260	260-280	
201	Beira Lago	10	260-280	240-260	220-260	200-260	200-260	200-260	240-260					
201	Transição PR	11	240-260	240-260	220-260	220-260	220-260	220-260	200-260					
201/ 203	Norte PR / Sul SP	12			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-320				
202	Arenito	13			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Grande Dourados	14			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Fronteira	15			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-340				
204	Serra	16			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
302	SP Baixa Altitude	21					220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-320		
303	Sul de Minas	23				220-280	200-260	200-260	200-260	200-260	200-260	240-300		
405	Bahia	34				380-420	380-420							


 INTACTA2
XTEND

 BASF
We create chemistry

ST 655 I2X

BSA65720I2X

SoyTech®

6.5 Grupo de maturação

172g Peso de mil grãos

 TOLERANTE AO ACAMAMENTO

 SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO

 DESEMPENHO EM ÁREAS DE VÁRZEA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

R MR

Podridão R. de Fitóftora R (Rps1k)

● ○

Cancro da Haste

● ○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	SET			OUT			NOV			DEZ
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10
101	Coxilha	01							220-240	220-240	240-260	260-280
101	Várzea	01							200-220	200-220	220-240	240-260
102	RS / SC (<400m)	02						220-240	200-220	200-220	220-240	240-260
201	Beira Lago	10	240-260	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240				
202	Arenito	13			240-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-260	300-350	
204	Serra	16			240-260	220-260	220-260	220-260	220-260	240-260	300-350	
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12				220-240	220-240	220-240	220-240	240-280	300-350	

*Levar em consideração todas as janelas de vazão sanitário da sua região.

■ Recomendado ■ Tolerado



INTACTA2
XTEND

BASF
We create chemistry

ST 670 I2X

BSA67785I2X

SoyTech®

6.7 Grupo de maturação

178g Peso de mil grãos

 **ALTO POTENCIAL PRODUTIVO**

 **PORTE CONTROLADO**

 **POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO**

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Branca

HILO: Marrom claro

REAÇÃO A DOENÇAS

R MR

Podridão R. de Fitóftora R (Rps1k) ● ○

Cancro da Haste ● ○

Pústula Bacteriana ● ○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 25	OUT			NOV			DEZ
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
101	Coxilha	01				240-260	240-260	260-280	280-320
102	RS / SC (<400m)	02			220-240	200-220	200-220	220-240	240-260
202	Arenito	13	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-320	260-360
204	Serra	16	220-300	220-300	220-300	220-300	220-300	240-320	260-360
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12	240-280	240-280	240-280	240-280	240-280		
302	SP Baixa Altitude	21		240-260	240-260	240-260	240-260		
303	Sul de Minas	23	220-260	220-280	220-280	220-280	220-280		

*Levar em consideração todas as janelas de vazão sanitário da sua região.
*Recomendada para região do Vale do Ivaí (Transição PR).

Recomendado Tolerado



EXEMPLIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE REFÚGIO

SoyTech®




O QUE É O REFÚGIO?

Soja BT: é a soja que teve seu código geneticamente modificado, recebendo proteína BT.

A soja não BT: é a variedade que não possui a proteína BT.

Serve para gerar indivíduos suscetíveis às proteínas BT > elas poderão cruzar com indivíduos sobreviventes do talhão com soja BT e assim preservar a biotecnologia.

Para que o refúgio seja efetivo, as sementes BT devem ser plantadas em 80% da área total de soja e 20% de sementes não BT, respeitando uma distância máxima de 800 metros das áreas com soja INTACTA. Essa prática auxilia em retardar a multiplicação de insetos resistentes à tecnologia.



BLOCO OU PIVÔ CENTRAL DE IRRIGAÇÃO

Pivô central onde 20% foram semeados com cultivar não BT e o restante com cultivar BT.

BORDADURA OU PERÍMETRO

Na bordadura da lavoura, foi realizada a semeadura com cultivar não BT, respeitando o mínimo de 20% da propriedade. E no centro temos uma cultivar com BT, respeitando o mínimo orientado de 80%.

TALHÃO

Nos dois talhões mais escuros foi realizada semeadura com cultivar não BT. Já nos demais talhões, em cinza claro, a semeadura foi feita com cultivares IPRO e I2X, ambas com presença de BT.

ÁREA NÃO BT


ÁREA BT



MAPA DE RECOMENDAÇÃO

REC	REGIÃO	Nº
101	Coxilha	01
101	Várzea	01
102	RS / SC (<400m)	02
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)	03
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04
102	Sudoeste PR	05
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da serra RS	06
103	Campos Gerais (<750m)	07
103	Sudoeste SP	08
104	Litoral SC	09
201	Beira Lago	10
201	Transição PR	11
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12
202	Arenito	13
204	Grande Dourados	14
204	Fronteira	15
204	Serra	16
301	MS Norte	17
301	Chapadões	18
301 / 401	Sudoeste GO	19
302 / 303	Pontal MG / Sul GO	20
302	SP Baixa Altitude	21

303	Triângulo MG /Sudeste GO	22
303	Sul de Minas	23
304	GO / MG	24
401	MT Sul	25
401	Grande Primavera	26
402	Parecis	27
402	BR 163	28
402	Rondônia	29
403	Vale do Araguaia	30
404	Norte GO	31
404	TO Sul	32
501	Norte TO / Sul PA	33
405	Bahia	34
501	MA / PI	35
502	Norte PA / MA	36





SoyTech®

SUA PRÓXIMA GERAÇÃO
DE **RESULTADOS**

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 **BASF**
We create chemistry