

Confiança
se cultiva com
FiberMax®



GUIA DE VARIEDADES

Região Centro

Safrá 2025/2026

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 **BASF**
We create chemistry

 **FiberMax®**
Algodão

PORTFÓLIO FIBERMAX

PARA SAFRA 2025/26

> 180 D.A.E

Ciclo Tardio

165 A 180 D.A.E

Ciclo Médio

< 160 D.A.E

Ciclo Precoce

FiberMax.

FM 990^{STP}

■ BASF
We create chemistry

FiberMax.
Algodão

FiberMax.

FM 985^{GLTP}

■ BASF
We create chemistry

FiberMax.
Algodão

FiberMax.

FM 978^{GLTP}

■ BASF
We create chemistry

FiberMax.
Algodão

LANÇAMENTO

FiberMax.

FM 979^{STP}

■ BASF
We create chemistry

FiberMax.
Algodão

FiberMax.

FM 974^{GLT}

■ BASF
We create chemistry

FiberMax.
Algodão

FiberMax.

FM 945^{STP}

■ BASF
We create chemistry

FiberMax.
Algodão

FiberMax.

FM 944^{GL}

■ BASF
We create chemistry

FiberMax.
Algodão

LANÇAMENTO

FiberMax.

FM 933^{STP}

■ BASF
We create chemistry

FiberMax.
Algodão

FiberMax.

FM 912^{GLTP}

■ BASF
We create chemistry


FiberMax.
Algodão

FiberMax.

FM 911^{GLTP}

■ BASF
We create chemistry

FiberMax.
Algodão



Região Centro

(GO, MG, MS)

Macrorregiões

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 Chapadões | 5 Sudoeste GO | 8 PAD-DF | 11 Norte de Minas |
| 2 Centro do MS | 6 Turvelândia | 9 Vale Araguaia de Goiás | 12 Triângulo MG |
| 3 Goiatuba | 7 Palmeiras | 10 Paracatu / Unaí | 13 Baixo Paranaíba |
| 4 Sudoeste GO (Mineiros) | | | |

**Variedades
FiberMax[®]**

STP





LANÇAMENTO

MAIS PRODUÇÃO, SEM **SEED COAT**.

Ciclo **Médio**
165 A 180 D.A.E

Crescimento
diário ideal **1,3 a 1,4** cm/dia

Peso de
capulho **4,7** g

BENEFÍCIOS:

- Rendimento de fibra superior (40–42%);
- Estabilidade produtiva com e sem nematoides;
- Manejo simplificado contra plantas daninhas resistentes;
- Qualidade de fibra superior (SCI > 140).

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de Galha;
- Nematóide Reniforme (MR);
- Ramulária Raça 1;
- Ramulária Raça 2.




Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax®
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO																							
		OUT					NOV					DEZ				JAN				FEV			
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
Chapadões	1	Alicinópolis/Chapadão do Céu/Chapadão do Sul/Costa Rica																					
Centro do MS	2	85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105			85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105										
Goiatuba	3	Goiatuba/Morinhos																					
Sudoeste GO (Mineiros)	4	Mineiros/Perolândia/Portelândia																					
Sudoeste GO	5	Mineiros (porção limite a Chapadão do Céu) Jataí/Montividiú/Paraúna/Rio Verde/Calapônia																					
Turvelândia	6	Turvelândia/Porteirão																					
Palmeiras	7	Palmeiras de Goiás																					
PAD-DF	8	Cristalina/Formosa/Luzilândia/São João D'aliança/Cabeceiras																					
Vale Araguaia de Goiás	9	Britânia/Aruanã																					
Paracatu / Unai	10	Buritiz/Paracatu/Unai																					
Paracatu / Unai (irrigado)	10	Buritiz (irrigado)/Paracatu (irrigado)/Unai (irrigado)																					
Norte de Minas	11	São Romão/Brasilândia de Minas/Pirapora/Buritiz																					
Triângulo MG	12	Lagamar/Lagoa Grande/Patos de Minas/Presidente Olegário/São Gonçalo do Abaeté/ Vazante/Coromandel/Monte Carmelo/Romaria/ Sacramento/Serra do Salitre																					
Triângulo MG (irrigado)	12	Patos de Minas (irrigado)/Presidente Olegário (irrigado)/São Gonçalo do Abaeté (irrigado)/Monte Carmelo (irrigado)/Serra do Salitre (irrigado)																					
Baixo Paranaíba	13	Itumbiara/Itutaba																					

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.



RESISTÊNCIA ONDE MAIS IMPORTA, **COLHEITA** ONDE POUCOS COLHEM.

BENEFÍCIOS:

- Flexibilidade na janela de plantio;
- Manejo simplificado com controle de plantas daninhas;
- Referência em produção em áreas de nematoides;
- Estabilidade produtiva.

Ciclo **Médio**
165 A 180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 a 1,2** cm/dia

Peso de capulho **4,7** g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de Galha;
- Nematóide Reniforme;
- Ramulária Raça 1;
- Ramulária Raça 2.




Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax®
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO																					
		OUT		NOV				DEZ				JAN				FEV				MAR	
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
Chapadões	1	Alcinópolis/Chapadão do Céu/Chapadão do Sul/Costa Rica																			
Centro do MS	2	São Gabriel do Oeste/Sonora/Bandeirantes/																			
Goiatuba	3	Goiatuba/Morinhos																			
Sudoeste GO (Mineiros)	4	Mineiros/Perolândia/Portelândia																			
Sudoeste GO	5	Mineiros (porção limite a Chapadão do Céu) Jataí/Montividiú/Parauína/Rio Verde/Calapônia																			
Turvelândia	6	Turvelândia/Porteirão																			
Palmeiras	7	Palmeiras de Goiás																			
PAD-DF	8	Cristalina/Formosa/Luzilândia/São João D'alíança/Cabeceiras																			
Vale Araguaia de Goiás	9	Britânia/Aruanã																			
Paracatu / Unai	10	Buritiz/Paracatu/Unai																			
Paracatu / Unai (irrigado)	10	Buritiz (irrigado)/Paracatu (irrigado)/Unai (irrigado)																			
Norte de Minas (Irrigado)	11	São Romão/Brasília de Minas/Pirapora/Buritiz																			
Triângulo MG	12	Lagamar/Lagoa Grande/Patos de Minas/Presidente Olegário/São Gonçalo do Abaeté/Vazante/Coromandel/Monte Carmelo/Romaria/Sacramento/Serra do Salitre																			
Triângulo MG (irrigado)	12	Patos de Minas (irrigado)/Presidente Olegário (irrigado)/São Gonçalo do Abaeté (irrigado)/Monte Carmelo (irrigado)/Serra do Salitre (irrigado)																			
Baixo Paranaíba	13	Itumbiara/Ituitaba																			

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.



LANÇAMENTO

FIRME NO CAMPO, FORTE NA COLHEITA.

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

BENEFÍCIOS:

- Rusticidade superior;
- Abertura de plantio na BA e MT;
- Capacidade de reconstrução do ponteiro;
- Maior teto produtivo.

Ciclo

Tardio
>180 D.A.E

Crescimento
diário ideal

1 cm/dia

Peso de
capulho

4,7 g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de Galha;
- Nematóide Reniforme (MR);
- Ramulária Raça 1;
- Ramulária Raça 2.




Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO		NOV		DEZ				JAN				FEV			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Chapadões	1				85 a 95	90 a 100	90 a 100	95 a 105							
Goatuba	3			80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100								
Sudoeste GO (Mineiros)	4		80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100									
Sudoeste GO	5			85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105							
Turvelândia	6		85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105								
Palmeiras	7		85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105							
PAD-DF	8	90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105										
Vale Araguaia de Goiás	9										95 a 95	90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105
Paracatu / Unai	10		90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 115							
Paracatu / Unai (irrigado)	10			90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105							
Norte de Minas	11							85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105		
Triângulo MG	12	85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105									
Triângulo MG (irrigado)	12	85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105							

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.



CAMPO LIMPO E RAIZ PROFUNDA.

BENEFÍCIOS:

- Material de alto potencial para abertura de plantio;
- Alto potencial mesmo em solos de textura média;
- Manejo simplificado com controle de plantas daninhas;
- Alto potencial produtivo.

Ciclo **Tardio**
>180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 a 1,2** cm/dia

Peso de capulho **4,2**g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Ramulária Raça 1.




Seletio® TwinLink® Plus
Biotecnologia

BASF
We create chemistry

FiberMax®
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO		OUT		NOV				DEZ				JAN				FEV			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Chapadões	1							80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100								
Centro do MS	2	80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100														
Goiatuba	3						80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100									
Sudoeste GO (Mineiros)	4								85 a 95	90 a 100	95 a 105	95 a 105							
Sudoeste GO	5							80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100								
Turvelândia	6						80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100									
Palmeiras	7						80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100									
PAD-DF	8					80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100										
Vale Araguaia de Goiás	9						80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100					80 a 90	85 a 95	85 a 95	85 a 95	90 a 100
Paracatu / Unai	10					80 a 90	85 a 95	85 a 95	85 a 95	90 a 100									
Paracatu / Unai (irrigado)	10							80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100								
Norte de Minas	11											85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105				
Triângulo MG	12					85 a 95	90 a 100	90 a 100	95 a 95										
Triângulo MG (irrigado)	12					80 a 90	85 a 95	85 a 95	85 a 95	85 a 100									
Baixo Paranaíba	13							80 a 90	85 a 95	85 a 95	85 a 100								

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

**Variedades
FiberMax[®]**

GLTP





CHEGUE MAIS RÁPIDO NAS MAIORES PRODUTIVIDADES.

BENEFÍCIOS:

- Material ideal da metade da janela ao fechamento;
- Mais rentabilidade, menos tempo no campo;
- Estabilidade produtiva;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Fibra de qualidade superior.

Ciclo **Precoce**
<160 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 cm/dia**

Peso de capulho **5,1 g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul.



GlyToL


**LIBERTY
LINK**
ALGODÃO

**TwinLink
Plus**

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO		NOV				DEZ				JAN				FEV				MAR		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Chapadões	1							90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110								
Centro do MS	2	90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110														
Goatuba	3						90 a 100	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 110									
Sudoeste GO (Mineiros)	4							90 a 100	95 a 105	95 a 105	105 a 115	105 a 115								
Sudoeste GO	5							90 a 100	95 a 105	95 a 105	105 a 115	105 a 115								
Turvelândia	6							90 a 100	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 110	105 a 115							
Palmeiras	7							90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110								
PAD-DF	8					90 a 100	95 a 105	95 a 105	105 a 115	105 a 115										
Vale Araguaia de Goiás	9													95 a 105	100 a 110	100 a 110	105 a 115	105 a 115	105 a 115	125
Paracatu / Unai	10							90 a 100	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 110								
Paracatu / Unai (irrigado)	10						90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110									
Norte de Minas	11										90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 110	100 a 110	100 a 110	125	
Triângulo MG	12							90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110	105 a 115							
Triângulo MG (irrigado)	12							90 a 100	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 110	100 a 110	100 a 110						
Baixo Paranaíba	13								90 a 100	95 a 105	100 a 110	100 a 110	100 a 110							

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.



MÁXIMA VELOCIDADE MESMO ENTRE NEMATOIDES.

BENEFÍCIOS:

- Ideal para o fechamento do plantio;
- Alto potencial produtivo;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Estabilidade produtiva;
- Fibras de qualidade superior.

Ciclo **Precoce**
<160 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 a 1,2 cm/dia**

Peso de capulho **5g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATOIDES

- Doença Azul;
- Nematóide de Galha;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyToL


**LIBERTY
LINK**
ALGODÃO

**TwinLink
Plus**

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO		NOV				DEZ				JAN				FEV				MAR		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Chapadões	1							90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110								
Centro do MS	2	90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110														
Goiatuba	3						90 a 100	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 110									
Sudoeste GO (Mineiros)	4							90 a 100	95 a 105	95 a 105	105 a 115	105 a 115								
Sudoeste GO	5							90 a 100	95 a 105	95 a 105	105 a 115	105 a 115								
Turvelândia	6							90 a 100	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 110	105 a 115							
Palmeiras	7							90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110								
PAD-DF	8					90 a 100	95 a 105	95 a 105	100 a 110	105 a 115										
Vale Araguaia de Goiás	9													95 a 105	100 a 110	100 a 110	105 a 115	105 a 115	105 a 115	
Paracatu / Unai	10							90 a 100	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 110								
Paracatu / Unai (irrigado)	10						90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110									
Norte de Minas	11											90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	105 a 115	105 a 115	105 a 115	115 a 125	
Triângulo MG	12							90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110	105 a 115							
Triângulo MG (irrigado)	12							90 a 100	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 110	100 a 110	100 a 110						
Baixo Paranaíba	13								90 a 100	95 a 105	100 a 110	100 a 110	100 a 110							

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.



POTÊNCIA QUE SE REFAZ, PRODUTIVIDADE QUE IMPRESSIONA.

• BENEFÍCIOS:

- Material ideal da metade da janela ao fechamento;
- Mais rentabilidade, menos tempo no campo;
- Estabilidade produtiva;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Fibra de qualidade superior.

Ciclo **Tardio**
>180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 a 1,2** cm/dia

Peso de capulho **4,4**g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Ramulária Raça 1;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyToL


LIBERTY LINK
ALGODÃO

TwinLink Plus

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO		OUT		NOV				DEZ				JAN				FEV			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Chapadões	1							85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105							
Centro do MS	2	85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105														
Goiatuba	3						85 a 95	90 a 100	95 a 105	95 a 105									
Sudoeste GO (Mineiros)	4								85 a 95	90 a 100	90 a 100	95 a 105							
Sudoeste GO	5							85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105							
Turvelândia	6						85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105								
Palmeiras	7						85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105							
PAD-DF	8					90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105										
Vale Araguaia de Goiás	9														85 a 95	90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105
Paracatu / Unai	10						90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 115							
Paracatu / Unai (irrigado)	10							90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105							
Norte de Minas (irrigado)	11											85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105		
Triângulo MG	12					85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105									
Triângulo MG (irrigado)	12					85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105							
Baixo Paranaíba	13							85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105							

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.



RESILIÊNCIA PARA TODOS OS CENÁRIOS.

BENEFÍCIOS:

- Material ideal da metade da janela ao fechamento;
- Mais rentabilidade, menos tempo no campo;
- Estabilidade produtiva;
- Escalonamento eficiente da colheita;
- Fibra de qualidade superior.

Ciclo **Tardio**
>180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 cm/dia**

Peso de capulho **4,0g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyToL


**LIBERTY
LINK**
ALGODÃO

**TwinLink
Plus**

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO		OUT		NOV				DEZ				JAN				FEV			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Chapadões	1							80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100								
Centro do MS	2	80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100														
Goiatuba	3						80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100									
Sudoeste GO (Mineiros)	4								85 a 95	90 a 100	95 a 105	95 a 105							
Sudoeste GO	5							80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100								
Turvelândia	6					80 a 90		85 a 95	85 a 95	90 a 100									
Palmeiras	7					80 a 90		85 a 95	85 a 95	90 a 100									
PAD-DF	8					80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100										
Vale Araguaia de Goiás	9					80 a 90		85 a 95	85 a 95	90 a 100				80 a 90	85 a 95	85 a 95	85 a 95	90 a 100	
Paracatu / Unai	10					80 a 90	85 a 95	85 a 95	85 a 95	90 a 100									
Paracatu / Unai (irrigado)	10							80 a 90	85 a 95	85 a 95	90 a 100								
Norte de Minas	11											85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105				
Triângulo MG	12					85 a 95	90 a 100	90 a 100	95 a 105										
Triângulo MG (irrigado)	12					80 a 90	85 a 95	85 a 95	85 a 95	85 a 100									
Baixo Paranaíba	13							80 a 90	85 a 95	85 a 95	85 a 100								

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

**Variedades
FiberMax[®]**

GLT





TRÊS VEZES MAIS VALOR: PRODUTIVIDADE, RENDIMENTO E QUALIDADE.

BENEFÍCIOS:

- Alto potencial produtivo;
- Qualidade de fibra acima do padrão;
- Estabilidade produtiva;
- Alta taxa de retenção de capulho;
- Alto rendimento com qualidade de fibra.

Ciclo **Médio**
165 A 180 D.A.E

Crescimento diário ideal **1 cm/dia**

Peso de capulho **4,0_g**

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES

- Doença Azul;
- Suscetível à Virose Atípica.



GlyToL


**LIBERTY
LINK**
ALGODÃO

TwinLink

BASF
We create chemistry

FiberMax
Algodão

MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO		OUT		NOV				DEZ				JAN				FEV			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Chapadões	1							85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105							
Centro do MS	2	85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105													
Goiatuba	3						85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105								
Sudoeste GO (Mineiros)	4								85 a 95	90 a 100	95 a 105	95 a 105							
Sudoeste GO	5								85 a 95	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 110						
Turvelândia	6						85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105								
Palmeiras	7						85 a 95	90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105							
PAD-DF	8					85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105									
Vale Araguaia de Goiás	9														85 a 95	90 a 100	90 a 100	95 a 105	95 a 105
Paracatu / Unai	10						90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110	100 a 115							
Paracatu / Unai (irrigado)	10							90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105							
Norte de Minas	11											85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105		
Triângulo MG	12					85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105									
Triângulo MG (irrigado)	12					85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105							
Baixo Paranaíba	13							85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105							

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

Variedades FiberMax[®]

GL





CLÁSSICO É CLÁSSICO.

Ciclo **Médio**
165 A 180 D.A.E

Crescimento
diário ideal **1** cm/dia

Peso de
capulho **4,6** g

RESISTÊNCIA A DOENÇAS E NEMATÓIDES


- Doença Azul.

BENEFÍCIOS:

- Refúgio com alta produtividade;
- Estabilidade consolidada;
- Ampla adaptabilidade;
- Desenvolvimento radicular agressivo e forte arranque inicial;
- Excelente formação de ponteiro;
- Qualidade de fibra reconhecida.



MAPA DE RECOMENDAÇÃO



População por época de plantio (mil plantas/ha) nas regiões recomendadas

MACRORREGIÃO		OUT		NOV				DEZ				JAN				FEV				MAR	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Chapadões	1								85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105								
Centro do MS	2	85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105															
Goiatuba	3							85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105									
Sudoeste GO (Mineiros)	4									90 a 100	90 a 100	100 a 110	100 a 110								
Sudoeste GO	5							85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105									
Turvelândia	6						85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	90 a 100	100 a 110									
Palmeiras	7							85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105									
PAD-DF	8						85 a 95	90 a 100	90 a 100	95 a 105											
Vale Araguaia de Goiás	9													90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110
Paracatu / Unai	10							85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105									
Paracatu / Unai (irrigado)	10							90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105									
Norte de Minas	11											90 a 100	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 105	95 a 105	100 a 110		
Triângulo MG	12					85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	105 a 110									
Triângulo MG (irrigado)	12					85 a 95	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	95 a 105	100 a 110								
Baixo Paranaíba	13								85 a 95	90 a 100	90 a 100	90 a 100	95 a 105								

Recomendação de população dividida por semana dentro do mês.

Confiança
se cultiva com
FiberMax®

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 **BASF**
We create chemistry

 **FiberMax®**
Algodão