GUIA DE VARIEDADES

2026/2027

SoyTech®

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

BASF
We create chemistry

A SUA PRÓXIMA GERAÇÃO DE **RESULTADOS** ESTÁ AQUI.

Na **SoyTech®**, cada semente é resultado de ciência, tecnologia e compromisso com quem produz. Somos a marca de licenciamento de sementes de soja da BASF, criada para entregar genética de alta performance, potencializando a produtividade no campo e transformando cada cultivar em resultado real. Porque acreditamos que, ao lado de quem multiplica, distribui e planta, nasce **sua próxima geração de resultados**.

ÍNDICE

CENTRO-NORTE 6

Lançamento **7**
ST 745 I2X **7**
ST 807 I2X **8**
ST 828 I2X **9**

Intacta 2 Xtend **10**
ST 616 I2X **10**
ST 641 I2X **11**
ST 711 I2X **12**
ST 752 I2X **13**
ST 822 I2X **14**

Intacta RR2 PRO **15**
BS 2606 IPRO **15**
ST 622 IPRO **16**

SUL 18

Lançamento **19**
ST 655 I2X 19
ST 670 I2X 20

Intacta 2 Xtend **21**
ST 535 I2X **21**
ST 541 I2X **22**
ST 570 I2X **23**
ST 580 I2X **24**
ST 616 I2X **25**
ST 641 I2X **26**

Intacta RR2 PRO **27**
BS 2606 IPRO **27**
ST 622 IPRO **28**

Round-up Ready **29**
TECIRGA 6070 RR **29**

Prática de Refúgio **30**
Mapa de Recomendação **32**

REGIÃO

CENTRO-NORTE

ST 745 I2X

LANÇAMENTO

BSA74483I2X

SoyTech®

7.4 Grupo de maturação

170g Peso de mil grãos

- TOLERANTE AO ACAMAMENTO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- PERMITE ABERTURA DE PLANTIO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Marrom Claro

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV			DEZ
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
301	Chapadões	18			280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300	320-380
304/ 401	Sudoeste GO	19		300-320	300-320	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320	300-360
302/ 303	Pontal Sul GO	20		300-320	280-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-300	300-360
303	Triangulo MG	22			260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-300	320-380
304	GO / MG	24				300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	320-380
304	GO / MG (Irrigado)	24		260-300	260-300	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300	360-420
401	MT Sul	25		320-340	300-340	280-300	280-300	280-300	280-300	320-340	300-360
401	Grande Primavera	26		320-340	300-340	280-320	280-320	280-300	280-300	320-340	300-360
402	Parecis	27	340-360	320-340	320-340	320-340	320-340	320-340	320-340		
402	BR 163	28	340-360	320-340	320-340	320-340	320-340	320-340			
402	Rondônia	29			300-320	280-300	280-300	280-300	300-360		
403	Vale do Araguaia	30			320-360	320-340	320-340	300-340	300-340	300-360	340-400
404	Norte GO	31				300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto Raça: 3	●	○
Nematoide de Cisto Raças: 6, 10 e 14	○	●
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora	○	●
Cancro da Haste	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	●	○
Pústula Bacteriana	●	○
Ferrugem Asiática	○	○

NÃO STS

INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

ST 807 I2X

LANÇAMENTO

BSA80777I2X

SoyTech®

8.0 Grupo de maturação

209g Peso de mil grãos

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET	OUT			NOV		
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
401	MT Sul	25	220-240	200-220	200-220	200-220	260-320		
401	Grande Primavera	26	220-240	200-220	200-220	200-220	260-320		
402	Parecis	27	220-250	220-240	220-240	220-240	220-240	260-320	
402	BR163	28	220-250	220-240	220-240	220-240	220-240	260-340	
403	Vale do Araguaia	30		240-280	240-280	240-280	240-280	260-340	260-340

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

- ELEVADO PESO DE GRÃOS
- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Branca
HILO: Marrom Claro

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto Raça: 3 e 10	●	○
Nematoide de Cisto Raças: 6 e 14	○	●
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora	●	○
Cancro da Haste	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

SIM STS

INTACTA 2 XTEND

BASF We create chemistry

ST 828 I2X

LANÇAMENTO

BSA82524I2X

SoyTech®

8.2 Grupo de maturação

170g Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- ÓTIMA ARQUITETURA DE PLANTA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Branca
HILO: Marrom Claro

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora	○	●
Cancro da Haste	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	●	○
Pústula Bacteriana	●	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET	OUT			NOV			DEZ
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
402	Parecis	27	210-230	200-220	200-220	200-220	200-220	230-250		
402	BR163	28	210-230	200-220	200-220	200-220	200-220	230-250		
403	Vale do Araguaia	30		240-260	230-250	230-250	230-250	230-250	230-250	260-360
404	Norte GO	31			240-260	230-250	230-250	230-250	230-250	240-260
405	Bahia	34			230-250	210-220	210-220	210-220	210-220	230-270
501	Norte TO/ Sul PA	33			240-260	230-250	230-250	230-250	230-250	240-320
501	MA / PI	35			240-260	230-250	230-250	230-250	230-250	240-320

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

SIM STS INTACTA 2 XTEND

BASF We create chemistry

ST 616 I2X

SoyTech®

6.1 Grupo de maturação

167g Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- ESTABILIDADE PRODUTIVA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17	●	○
Cancro da Haste	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET			OUT			NOV			DEZ		
			0-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
101	Coxilha	01					220-240	220-240	220-240	220-260	240-300	260-300	280-340	300-360
102	RS/SC (<400m)	02					240-260	240-260	230-250	230-250	230-250	250-270		
102	RS/SC (>650m) e PR (>500m)	04				250-270	230-250	230-250	230-250	230-250	250-270			
102	RS/SC Transição (>400<650m)	03					220-240	220-240	220-240	230-250	230-250	230-250		
102	Sudoeste PR	05			240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260				
103	Campos Gerais (>750m)	06				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
103	Campos Gerais (<750m)	07				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300	220-340		
103	Sudoeste SP	08		240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
104	Litoral SC	09					200-220	200-220	220-240	220-240	220-240	240-260	260-280	
201	Beira Lago	10	260-280	240-260	220-260	200-260	200-260	200-260	240-260					
201	Transição PR	11	240-260	240-260	220-260	180-260	180-260	180-260	200-260					
201/ 203	Norte PR / Sul SP	12			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-320				
202	Arenito	13			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Grande Dourados	14			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Fronteira	15			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-340				
204	Serra	16			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
302	SP Baixa Altitude	21					220-240	220-240	220-240	220-240	220-320			
303	Sul de Minas	23					220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
405	Bahia	34				380-420	380-420							

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

NÃO STS INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

ST 641 I2X

SoyTech®

6.4 Grupo de maturação

176g Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO
- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET	OUT			NOV		
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-300	
204	Grande Dourados	14	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	
202	Arenito	13	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-330
204	Fronteira	15	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-300	
204	Serra	18	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	
301	Chapadões	18		330-350	310-330	310-330	310-330	310-330	330-390
301	MS Norte	17		330-350	310-330	310-330	310-330	310-330	310-390
301 / 401	Sudoeste GO	19		330-370	330-350	330-350	330-350	330-350	330-400
303	Triângulo MG	22		290-310	270-300	270-300	270-300	270-300	270-350
302 / 303	Pontal MG/ Sul GO	20		350-370	330-350	330-350	330-350	330-350	350-400
302	SP Baixa Altitude	21		280-300	250-270	250-270	250-270	250-270	250-340
304	GO / MG	24			360-400	340-360	340-360	340-360	340-440
304	GO / MG (Irrigado)	24	330-350	330-350	330-350	330-350	320-340	320-340	320-340
404	Norte GO	31			380-400	360-380	360-380	360-380	360-440

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17	●	○
Cancro da Haste *D. aspalathi*	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	●
Pústula Bacteriana	●	○
Ferrugem Asiática	○	○

NÃO STS INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

ST 711 I2X

SoyTech®

7.1 Grupo de maturação

172g Peso de mil grãos

- MULTIRRESISTENTE À NEMATOIDE DE CISTO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- TOLERANTE AO ACAMAMENTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Roxa
FLOR: Cinza
HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto Raça: 3	●	○
Nematoide de Cisto Raças: 9, 10 e 14	○	●
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora	○	●
Cancro da Haste	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	●	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV		
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
301	Chapadões	18			280-320	280-300	280-300	280-300	280-300	
301	MS Norte	17			280-320	280-300	280-300	280-300	280-300	280-340
301 / 401	Sudoeste GO	19			300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-380
302	SP Baixa Altitude	21				240-280	240-280	240-280	240-340	260-360
302 / 303	Pontal MG/ Sul GO	20			280-340	280-320	280-320	280-320	280-380	300-380
303	Triangulo MG/ Sudeste GO	22			280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	
304	GO / MG	24				260-300	260-300	260-300	260-300	
404	Norte GO	31				280-320	280-320	280-320	280-320	300-380
401	Grande Primavera	26	340-360	320-360	320-340	300-320	300-320	300-320	300-320	
401	MT Sul	25	340-360	320-340	300-320	300-320	300-320	300-320	300-400	
402	BR 163	28	360-380	340-360	340-360	320-340	320-340	320-340	340-360	
402	Parecis	27	360-380	340-360	320-360	320-340	320-340	320-340	320-420	
402	Rondônia	29			280-300	280-300	280-300	280-300	280-380	
403	Vale do Araguaia	30			380-400	360-400	360-380	360-380	360-380	360-380
405	Bahia	34			380-400	380-400	380-400	380-400		

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

SIM STS INTACTA 2 XTEND BASF We create chemistry

ST 752 I2X

SoyTech®

7.5 Grupo de maturação

204g Peso de mil grãos

- ESTABILIDADE PRODUTIVA
- ELEVADO PESO DE GRÃOS
- MULTIRRESISTENTE À NEMATOIDE DE CISTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto Raça: 3 e 14	●	○
Nematoide de Cisto Raças: 6 e 9	○	●
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora	○	●
Cancro da Haste *D. aspalathi*	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	●	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV			DEZ			JAN	
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
301 / 401	Sudoeste GO	19		240-260	240-260	240-240	220-240	220-240	220-240	220-370					
301	Chapadões	18			220-240	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220					
301	MS Norte	17		220-240	220-240	200-220	200-220	200-220	200-220	200-370					
302 / 303	Pontal MG / Sul GO	20			240-260	220-240	220-240	220-240	220-240						
303	Triângulo MG/ Sudeste GO	22			200-220	200-220	200-220	200-220	200-220						
302	SP Baixa Altitude	21				180-200	180-200	180-200	180-200	220-370					
304	GO / MG	24		200-240	180-220	180-240	180-240	180-240	180-240	200-370					
404	Norte GO	31				220-260	220-260	220-260	220-260	220-380					
401	Grande Primavera	26	300-320	300-320	260-280	240-280	240-280	240-280	280-380						
401	MT Sul	25	300-320	300-320	260-280	240-280	240-280	240-280	280-380						
402	BR 163	28	300-320	300-320	260-300	260-300	260-300	260-300	280-380						
402	Parecis	27	300-320	300-320	260-300	260-300	260-300	260-300	280-380						
402	Rondônia	29			240-260	240-260	240-260	240-260	240-300	280-420					
403	Vale do Araguaia	30			340-360	300-320	300-320	300-320	300-320	300-380					
405	Bahia	34			280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	300-420					
501	MA / PI	35			300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	300-400					
404	TO Sul	32				300-360	300-360	300-360	300-360						
501	Norte TO / Sul PA	33				340-400	340-400	340-400	340-400						
502	Norte PA/ MA	36									300-340	300-340	300-340	300-340	300-340

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

NÃO STS INTACTA 2 XTEND

BASF We create chemistry

ST 822 I2X

SoyTech®

8.2 Grupo de maturação

195g Peso de mil grãos

- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO
- PERMITE ABERTURA DE PLANTIO
- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora	○	○
Cancro da Haste *D. aspalathi*	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	●
Pústula Bacteriana	●	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV			DEZ		
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
301	MS Norte	17			180-200	180-200	180-200	180-200	180-200	180-280			
304	GO/MG	24			200-240	180-220	180-220	180-220	180-220	180-280			
401	MT Sul	25	220-240	220-240	200-220	200-220	200-220	200-300					
401	Grande Primavera	26	220-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-300					
402	BR163	28	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-320					
402	Parecis	27	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-320					
402	Rondonia	29			200-220	180-200	180-200	180-200	180-330				
403	Vale do Araguaia	30			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260				
404	Norte GO	31			220-260	200-240	200-240	200-240	200-240	200-280			
404	TO Sul	32			240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-340			
405	Bahia	34			200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-320			
501	Norte TO/ Sul PA	33			240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-340			
501	MA / PI	35				240-260	240-260	240-260	240-260	240-340			
502	Norte PA/ MA	36				240-260	240-260	240-260	240-260	240-340	240-260	240-260	240-260
301/ 401	Sudoeste GO	19			180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	180-280			

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

SIM STS INTACTA 2 XTEND

BASF We create chemistry

BS 2606 IPRO

SoyTech®

6.0 Grupo de maturação

173g Peso de mil grãos

- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO
- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1c) Raças: 1, 3 , 7 e 17	●	○
Cancro da Haste *D. aspalathi*	○	●
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	●
Pústula Bacteriana	●	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV		
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
101	Coxilha	01				260-280	240-260	240-260	240-260	240-260
102	RS/SC (<400m)	02			280-300	260-280	260-280	220-240	220-240	280-300
102	RS/SC (>650m) e PR (>500m)	04		260-280	240-260	220-240	200-220	200-220	220-240	240-260
102	RS/SC Transição (>400 <650m)	03			260-280	240-260	220-240	220-240	240-260	260-280
102	Sudoeste PR	05		280-300	240-260	220-240	200-220	200-220	200-220	240-260
103	Campos Gerais < 750m	07			260-280	240-260	220-240	220-240	220-240	240-260
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da Serra RS	06			240-260	240-260	200-220	200-220	200-220	240-260
201	Beira Lago	10	280-300	260-280	260-280	220-240	220-240			
201	Transição PR	11	260-280	240-260	240-260	200-220	200-220	200-220		
202	Arenito	13		280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	
204	Fronteira	15		260-280	240-260	240-260	240-260	240-260		
204	Grande Dourados	14		280-300	260-280	260-280	260-280	260-280		
204	Serra	16		280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	
201 / 203	Norte PR /Sul SP	12		260-280	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	260-280
301	Chapadões	18			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	
302	SP Baixa Altitude	21			380-400	360-380	360-380	360-380	360-380	380-400
303	Triângulo MG	22			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420
304	GO / MG	24			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420
301 / 401	Sudoeste GO	19			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420
302 / 303	Pontal Sul GO	20			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

SIM STS INTACTA RR2 PRO®

BASF
We create chemistry

ST 622 IPRO

SoyTech®

6.2 Grupo de maturação

173g Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- TOLERANTE AO ACAMAMENTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora	○	●
Cancro da Haste *D. aspalathi*	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV			DEZ	
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
101	Várzea	01						280-300	280-300	280-300	300-320	320-360
101	Coxilha	01					280-300	280-300	280-300	280-300	300-320	320-360
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)	03					240-260	240-260	240-260	240-260	260-280	260-280
102	RS / SC (<400m)	02					280-320	260-280	260-280	260-280	280-320	
102	Sudoeste PR	05	260-280	260-280	260-280	220-240	220-240					
103	Campos gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da Serra RS	06		260-300	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-300	
103	Campos Gerais (<750m)	07		260-300	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-300	
103	Sudoeste SP	08	280-320	220-240	240-260	220-240	220-240	240-260	240-260			
104	Litoral SC	09						260-280	260-280	260-280	260-280	280-320
201	Beira Lago	10		260-300	240-260	240-260	240-260	260-300				
201	Transição PR (<600m)	11		260-300	240-260	240-260	240-260	260-300				
201	Transição PR (>600m)	11		240-260	220-240	220-240	220-240	240-260				
201 / 203	Norte PR / Sul SP (<500m)	12		260-300	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260			
201 / 203	Norte PR / Sul SP (>500m)	12			220-240	220-240	220-240	220-240	220-240			
202	Arenito (PR)	13			260-300	260-280	260-280	260-280	260-300			
202	Arenito (MS)	13			280-320	260-280	240-260	240-260	260-300			
204	Grande Dourados	14			260-300	260-280	240-260	240-260	260-300			
204	Fronteira	15		280-320	260-280	240-260	240-260	240-260	260-300			
204	Serra	16		280-320	260-280	260-280	260-280	260-280	260-300			
302	SP Baixa Altitude	21			270-310	250-270	250-270	250-270	250-270			
303	Triângulo MG /Sudeste GO	22			350-390	330-350	330-350	330-350	350-390			
304	GO / MG	24			400-440	380-300	330-300	360-380	360-380	360-380		

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

NÃO STS

INTACTA RR2 PRO®

BASF
We create chemistry

REGIÃO

SUL

ST 655 I2X

LANÇAMENTO

BSA65720I2X

SoyTech®

6.5 Grupo de maturação

165g Peso de mil grãos

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV		
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
201	Beira Lago	10	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
202	Arenito	13			220-240	220-240	220-240	220-240	240-280	300-350
204	Serra	16			220-240	220-240	220-240	220-240	240-280	300-350
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12			220-240	220-240	220-240	220-240	240-280	300-350

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

- SANIDADE FOLIAR DIFERENCIADA
- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO
- ESTABILIDADE PRODUTIVA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17	●	○
Cancro da Haste	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	●	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

NÃO STS

INTACTA 2 XTEND

BASF We create chemistry

ST 670 I2X

LANÇAMENTO

BSA67785I2X

SoyTech®

6.7 Grupo de maturação

170g Peso de mil grãos

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	OUT			NOV			DEZ
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
202	Arenito	13	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-280	260-360
204	Serra	16	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	260-360
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-280	260-360

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO
- TOLERANTE AO ACAMAMENTO
- RESPONSIVA A ALTAS FERTILIDADES

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Branca
HILO: Marrom Claro

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17	●	○
Cancro da Haste	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	○
Pústula Bacteriana	●	○
Ferrugem Asiática	○	○

SIM STS INTACTA 2 XTEND

BASF We create chemistry

ST 535 I2X

SoyTech®

5.3 Grupo de maturação

173g Peso de mil grãos

EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO

PRECOCIDADE

NÃO É STS

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1c) Raças: 1, 3, 7 e 17	●	○
Cancro da Haste	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	○
Pústula Bacteriana	○	●
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET	OUT			NOV		
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
102	RS / SC Transição (>400 <650m)	03		280-300	300-320	300-320	300-320	300-320	320-340
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04	320-340	300-320	300-320	300-320	300-320	300-320	320-340
103	Campos gerais (>750m)	06		310-330	300-320	300-320	300-320	300-320	320-340
103	Campos Gerais (<750m)	07		310-330	300-320	300-320	300-320	300-320	320-360

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

NÃO STS

INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

ST 541 I2X

SoyTech®

5.4 Grupo de maturação

205g Peso de mil grãos

- PERMITE ABERTURA DE PLANTIO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- TOLERANTE AO ACAMAMENTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET	OUT			NOV			DEZ
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
101	Coxilha	01		330-350	320-340	300-320	300-320	300-320	320-350	330-350
102	RS/SC Transição (Entre 400 e 650m)	03		330-350	320-350	320-350	320-350	320-350	330-370	
102	RS/SC (>650m) e PR (>500m)	04	270-290	280-300	280-300	280-300	280-300	280-300	320-340	
103	Campos Gerais (>750m)	07		280-300	280-300	280-300	280-300	280-300	280-370	
103	Campos Gerais (<750m)	06	280-320	260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-370	
103	Sudoeste SP	08	340-360	300-320	300-320	300-320	300-320	320-360	320-360	
104	Litoral SC	09			320-340	280-300	280-300	280-300	300-320	320-340
201	Transição PR	11		300-320	280-300	280-300	300-320	320-350	320-340	

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17	●	○
Cancro da Haste *D. aspalathi*	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	○
Pústula Bacteriana	●	○
Ferrugem Asiática	○	○

NÃO STS INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

ST 570 I2X

BSA57079I2X

SoyTech®

5.7 Grupo de maturação

179g Peso de mil grãos

- SANIDADE FOLIAR DIFERENCIADA
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET	OUT			NOV			DEZ
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
101	Coxilha	01				220-240	220-240	230-250	240-260	260-350
102	RS/SC (< 400 m)	02			250-270	240-260	240-260	240-260	250-260	
102	RS/SC (> 650 m) e PR (> 500m)	04		200-220	200-240	200-240	220-240	220-240	240-280	
102	RS/SC Transição (> 400< 650 m)	03		220-240	220-240	220-240	240-260	240-260	240-260	
102	Sudoeste PR	05	240-280	230-260	230-260	230-260	230-260	230-260	240-300	
103	Campos Gerais (> 750 m)	06		230-250	220-240	220-240	220-240	220-240	230-330	
103	Campos Gerais (< 750 m)	07		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300	
103	Sudoeste de SP	08	240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	230-350	
104	Litoral SC	09				200-220	220-240	220-240	240-260	260-350
201	Transição do PR	11	250-280	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	250-350	

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1c) Raças: 1, 3, 7 e 17	●	○
Cancro da Haste	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

NÃO STS INTACTA 2 XTEND BASF We create chemistry

ST 580 I2X

SoyTech®

5.8 Grupo de maturação

210g Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET	OUT			NOV			DEZ
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
101	Coxilha	01			250-280	230-260	220-240	220-240	230-260	250-330
102	RS / SC (<400m)	02			250-280	230-260	220-240	220-240	230-260	250-280
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04	230-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230-260	230-330
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)	03			220-240	220-240	230-260	230-260	230-260	230-300
102	Sudoeste PR	05	230-260	220-240	220-240	220-240	220-240	230-260		
103	Campos gerais (<750m)	07	230-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230-300	
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense Campos de Cima da Serra RS	06		230-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230-330
103	Sudoeste SP	08	230-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230-350	
104	Litoral SC	09			260-300	220-240	220-240	220-240	220-240	230-260
201	Transição PR (>600m)	11	230-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230-330	

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17	●	○
Cancro da Haste *D. aspalathi*	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	●	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

NÃO STS INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

ST 616 I2X

SoyTech®

6.1 Grupo de maturação

167g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA

ESTABILIDADE PRODUTIVA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17	●	○
Cancro da Haste	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET			OUT			NOV			DEZ		
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
101	Coxilha	01					220-240	220-240	220-240	220-260	240-300	260-300	280-340	300-360
102	RS/SC (<400m)	02					240-260	240-260	230-250	230-250	230-250	250-270		
102	RS/SC (>650m) e PR (>500m)	04				250-270	230-250	230-250	230-250	230-250	250-270			
102	RS/SC Transição (>400<650m)	03					220-240	220-240	220-240	230-250	230-250	230-250		
102	Sudoeste PR	05			240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260				
103	Campos Gerais (>750m)	06				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
103	Campos Gerais (<750m)	07				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300	220-340		
103	Sudoeste SP	08		240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
104	Litoral SC	09					200-220	200-220	220-240	220-240	220-240	240-260	260-280	
201	Beira Lago	10	260-280	240-260	220-260	200-260	200-260	200-260	240-260					
201	Transição PR	11	240-260	240-260	220-260	180-260	180-260	180-260	200-260					
201/ 203	Norte PR / Sul SP	12			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-320				
202	Arenito	13			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Grande Dourados	14			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Fronteira	15			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-340				
204	Serra	16			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
302	SP Baixa Altitude	21					220-240	220-240	220-240	220-240	220-320			
303	Sul de Minas	23					220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
405	Bahia	34				380-420	380-420							

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

NÃO STS INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

ST 641 I2X

SoyTech®

6.4 Grupo de maturação

176g Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO
- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET	OUT			NOV		
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-300	
204	Grande Dourados	14	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	
202	Arenito	13	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-330
204	Fronteira	15	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-300	
204	Serra	18	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	
301	Chapadões	18		330-350	310-330	310-330	310-330	310-330	330-390
301	MS Norte	17		330-350	310-330	310-330	310-330	310-330	310-390
301 / 401	Sudoeste GO	19		330-370	330-350	330-350	330-350	330-350	330-400
303	Triângulo MG	22		290-310	270-300	270-300	270-300	270-300	270-350
302 / 303	Pontal MG/ Sul GO	20		350-370	330-350	330-350	330-350	330-350	350-400
302	SP Baixa Altitude	21		280-300	250-270	250-270	250-270	250-270	250-340
304	GO / MG	24			360-400	340-360	340-360	340-360	340-440
304	GO / MG (Irrigado)	24	330-350	330-350	330-350	330-350	320-340	320-340	320-340
404	Norte GO	31			380-400	360-380	360-380	360-380	360-440

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17	●	○
Cancro da Haste *D. aspalathi*	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	●
Pústula Bacteriana	●	○
Ferrugem Asiática	○	○

NÃO STS INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

BS 2606 IPRO

SoyTech®

6.0 Grupo de maturação

173g Peso de mil grãos

- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO
- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1c) Raças: 1, 3 , 7 e 17	●	○
Cancro da Haste *D. aspalathi*	○	●
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	●
Pústula Bacteriana	●	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV		
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
101	Coxilha	01				260-280	240-260	240-260	240-260	240-260
102	RS/SC (<400m)	02			280-300	260-280	260-280	220-240	220-240	280-300
102	RS/SC (>650m) e PR (>500m)	04		260-280	240-260	220-240	200-220	200-220	220-240	240-260
102	RS/SC Transição (>400 <650m)	03			260-280	240-260	220-240	220-240	240-260	260-280
102	Sudoeste PR	05		280-300	240-260	220-240	200-220	200-220	200-220	240-260
103	Campos Gerais < 750m	07			260-280	240-260	220-240	220-240	220-240	240-260
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da Serra RS	06			240-260	240-260	200-220	200-220	200-220	240-260
201	Beira Lago	10	280-300	260-280	260-280	220-240	220-240			
201	Transição PR	11	260-280	240-260	240-260	200-220	200-220	200-220		
202	Arenito	13		280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	
204	Fronteira	15		260-280	240-260	240-260	240-260	240-260		
204	Grande Dourados	14		280-300	260-280	260-280	260-280	260-280		
204	Serra	16		280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	
201 / 203	Norte PR /Sul SP	12		260-280	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	260-280
301	Chapadões	18			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	
302	SP Baixa Altitude	21			380-400	360-380	360-380	360-380	360-380	380-400
303	Triângulo MG	22			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420
304	GO / MG	24			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420
301 / 401	Sudoeste GO	19			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420
302 / 303	Pontal Sul GO	20			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

SIM STS INTACTA RR2 PRO®

BASF
We create chemistry

ST 622 IPRO

SoyTech®

6.2 Grupo de maturação

173g Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- TOLERANTE AO ACAMAMENTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza
FLOR: Roxa
HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora	○	●
Cancro da Haste *D. aspalathi*	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV			DEZ	
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
101	Várzea	01						280-300	280-300	280-300	300-320	320-360
101	Coxilha	01					280-300	280-300	280-300	280-300	300-320	320-360
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)	03					240-260	240-260	240-260	240-260	260-280	260-280
102	RS / SC (<400m)	02					280-320	260-280	260-280	260-280	280-320	
102	Sudoeste PR	05	260-280	260-280	260-280	220-240	220-240					
103	Campos gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da Serra RS	06		260-300	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-300	
103	Campos Gerais (<750m)	07		260-300	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-300	
103	Sudoeste SP	08	280-320	220-240	240-260	220-240	220-240	240-260	240-260			
104	Litoral SC	09						260-280	260-280	260-280	260-280	280-320
201	Beira Lago	10		260-300	240-260	240-260	240-260	260-300				
201	Transição PR (<600m)	11		260-300	240-260	240-260	240-260	260-300				
201	Transição PR (>600m)	11		240-260	220-240	220-240	220-240	240-260				
201 / 203	Norte PR / Sul SP (<500m)	12		260-300	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260			
201 / 203	Norte PR / Sul SP (>500m)	12			220-240	220-240	220-240	220-240	220-240			
202	Arenito (PR)	13			260-300	260-280	260-280	260-280	260-300			
202	Arenito (MS)	13			280-320	260-280	240-260	240-260	260-300			
204	Grande Dourados	14			260-300	260-280	240-260	240-260	260-300			
204	Fronteira	15		280-320	260-280	240-260	240-260	240-260	260-300			
204	Serra	16		280-320	260-280	260-280	260-280	260-280	260-300			
302	SP Baixa Altitude	21			270-310	250-270	250-270	250-270	250-270			
303	Triângulo MG /Sudeste GO	22			350-390	330-350	330-350	330-350	350-390			
304	GO / MG	24			400-440	380-300	330-300	360-380	360-380	360-380		

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

NÃO STS

INTACTA RR2 PRO®

BASF
We create chemistry

TECIRGA 6070 RR

SoyTech®

6.3 Grupo de maturação

145g Peso de mil grãos

- SANIDADE FOLIAR DIFERENCIADA
- ADAPTADO A ÁREAS DE VÁRZEA
- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado
PUBESCÊNCIA: Cinza claro
FLOR: Branca
HILO: Marrom Claro

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	○	○
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora (Rps1c) Raças: 1, 3 , 7 e 17	●	○
Cancro da Haste *D. aspalathi*	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	●	○
Pústula Bacteriana	●	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	OUT			NOV			DEZ			JAN		
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
101	Várzea	01	300-320	280-300	280-300	280-300	280-300	300-320	300-320	320-340	360-380	360-380	360-380	360-380
104	Litoral SC	09			280-300	260-280	260-280	260-280	280-300	300-320	320-340	340-360		

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

NÃO STS

Roundup Ready SOJA

BASF
We create chemistry

EXEMPLIFICAÇÃO DA **PRÁTICA DE REFÚGIO**

SoyTech®

O QUE É O REFÚGIO?

Soja BT: é a soja que teve seu código geneticamente modificado, recebendo proteína BT.

A soja não BT: é a variedade que não possui a proteína BT.

Serve para gerar indivíduos suscetíveis às proteínas BT > elas poderão cruzar com indivíduos sobreviventes do talhão com soja Bt e assim preservar a biotecnologia.

Para que o refúgio seja efetivo, as sementes BT devem ser plantadas em 80% da área total de soja e 20% de sementes não BT, respeitando uma distância máxima de 800 metros das áreas com soja INTACTA. Essa prática auxilia em retardar a multiplicação de insetos resistentes à tecnologia.





BLOCO OU PIVÔ CENTRAL DE IRRIGAÇÃO

Pivô central onde 20% foram semeados com cultivar não BT e o restante com cultivar BT.





BORDADURA OU PERÍMETRO

Na bordadura da lavoura, foi realizada a semeadura com cultivar não BT, respeitando o mínimo de 20% da propriedade. E no centro temos uma cultivar com BT, respeitando o mínimo orientado de 80%.



TALHÃO

Nos dois talhões mais escuros foi realizada semeadura com cultivar não BT. Já nos demais talhões, em cinza claro, a semeadura foi feita com cultivares IPRO e I2X, ambas com presença de BT.

ÁREA NÃO BT ÁREA BT

MAPA DE RECOMENDAÇÃO

SoyTech®

REC	REGIÃO	Nº
101	Coxilha	01
101	Várzea	01
102	RS / SC (<400m)	02
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)	03
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04
102	Sudoeste PR	05
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da serra RS	06
103	Campos Gerais (<750m)	07
103	Sudoeste SP	08
104	Litoral SC	09
201	Beira Lago	10
201	Transição PR	11
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12
202	Arenito	13
204	Grande Dourados	14
204	Fronteira	15
204	Serra	16
301	MS Norte	17
301	Chapadões	18
301 / 401	Sudoeste GO	19
302 / 303	Pontal MG / Sul GO	20
302	SP Baixa Altitude	21
303	Triângulo MG /Sudeste GO	22
303	Sul de Minas	23
304	GO / MG	24
401	MT Sul	25
401	Grande Primavera	26
402	Parecis	27
402	BR 163	28
402	Rondônia	29
403	Vale do Araguaia	30
404	Norte GO	31
404	TO Sul	32
501	Norte TO / Sul PA	33
405	Bahia	34
501	MA / PI	35
502	Norte PA / MA	36



SoyTech®

SUA PRÓXIMA GERAÇÃO
DE **RESULTADOS**

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

BASF
We create chemistry